

【レジメン名】
ALIMTA 療法

【適応疾患】
非小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】
1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ペメトレキセド/ALIMTA 500mg/m ²	点滴静注	10 分	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液 デキサート	100mL 6.6mg	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓				↓
生理食塩液 アリムタ	100mL 500mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	10 分	↓				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓				↓
メチコパール	1mg	アリムタの 副作用予防	筋注	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで					

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d21	d1
パンビタン末 1g/日 1 日 1 回	アリムタの 副作用予防	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで						

副作用

《主な副作用（Grade≥3）》 J Clin Oncol.22(9):1589-97(2004).(p1594-1595)

発熱性好中球減少症 1.9%
好中球減少(Grade≥3) 5.3%
貧血(Grade≥3) 4.2%
血小板減少(Grade≥3) 1.9%
疲労(All Grade) 34.0%
悪心(All Grade) 30.9%
嘔吐(All Grade) 16.2%
口内炎(All Grade) 14.7%
下痢(All Grade) 12.8%
皮疹(All Grade) 14.0%