

【レジメン名】

AMR 療法

【適応疾患】

非小細胞肺癌・小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21～28 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
アムルピシン/AMR 45mg/m2	静注	5 分	day1、2、3

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	d3	...	d21	d1
5%ブドウ糖液	250mL	ルート確保	点滴静注	90 分	↓					↓
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓					↓
デキサート	9.9mg									
アロキシ	0.75mg									
生理食塩液	20mL	抗癌剤	静注	5 分	↓					↓
カルセド	45mg/m2									
5%ブドウ糖液	250mL	ルート確保	点滴静注	90 分		↓	↓			
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分		↓	↓			
デキサート	6.6mg									
生理食塩液	20mL	抗癌剤	静注	5 分		↓	↓			
カルセド	45mg/m2									

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	d5	...	d21
デカドロン錠 8mg/回 1 日 2 回 朝昼食後	吐き気予防				↓	↓		

【副作用】

《主な副作用(10%以上の頻度)》(カルセドの添付文書より)

白血球減少(93.9%)、好中球減少(95.0%)、ヘモグロビン減少(81.2%)、血小板減少(47.0%)、食欲不振(65.7%)、悪心・嘔吐(58.6%)、脱毛(70.4%)、ALT 上昇(22.7%)、AST 上昇(17.1%)、発熱(29.8%)