

【レジメン名】

XELOX 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☒ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用薬剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
カペシタビン/Cape 2000mg/m ²	経口	2 回/日	day1～day14
オキサリプラチン/L-OHP 130mg/m ²	点滴静注	2 時間	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
プロイメンド	150mg								
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
デキサート	4.95mg								
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	2 時間	↓				↓
オキサリプラチン	130mg/m ²								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	投与量	目的	d1	d2	d3	d4	...	d14	...	d21	d1
カペシタビン錠	2000mg/m ²	抗癌剤	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓
1 日 2 回 朝夕食後											
グラニセトロンゼリー	2mg/回	吐き気止め	↓								
1 日 1 回											
デカドロン錠	4mg/日	吐き気止め		↓	↓	↓					
1 日 2 回 朝食後											
ピドキサル錠	30mg/日	手足症候群 の予防	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1 日 3 回 毎食後											
ベギンクリーム(尿素クリーム)		手足症候群 の予防	連日使用								
1 日 5 回 塗布 手足全体											
アンテベート軟膏(ベリーストロング)		手足症候群 の治療	症状発現時使用								
1 日 2 回 塗布 体・爪周囲の症状発現部位											

【副作用】

《主な副作用》 海外第Ⅲ相臨床試験(NO16967 試験)

神経毒性(71.4%)、悪心・嘔吐(65.9%)、下痢(56.9%)、手足症候群(22.5%)、好中球/顆粒球減少症(18%)、口内炎(13.5%)、発熱性好中球減少症(0.3%)