

【レジメン名】

アブラキサン単剤 Weekly 療法

【適応疾患】

非小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
nab-パクリタキセル/nab-PAC 100mg/m2	点滴静注	30 分	day1,8,15

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	...	d8	...	d15	...
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓		↓		↓	
デキサート	6.6mg									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓		↓		↓	
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓		↓		↓	
アブラキサン	100mg/m2									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	30 分	↓		↓		↓	

【遺伝子検査】

治療開始に必要な遺伝子検査なし

【副作用】

≪主な副作用≫非小細胞肺がんの国際共同第Ⅲ相試験(CA031 試験)(日本人 72 例を含む) 好中球減少(59.1%)、脱毛(55.8%)、貧血(48.8%)、末梢神経障害(45.5%)、血小板減少(44.7%)、白血球減少症(29.0%)、悪心(25.7%)、疲労(22.0%)、無力症(12.6%)、食欲減退(16.1%)、関節痛(11.7%)、便秘(10.5%)、嘔吐(10.5%)、下痢(10.1%)
