

【レジメン名】

RAM+wPAC 療法

【適応疾患】

胃癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 28 日

【使用抗癌剤】

商品名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ラムシルマブ/RAM 8mg/kg	点滴静注	1 時間	day1、15
パクリタキセル/PAC 80mg/m2	点滴静注	1 時間	day1、8、15

【注射スケジュール】

一般名/ 投与量	目的	手技	点滴時間	d1	...	d8	...	d15	...	d28
生理食塩液 100mL デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg	吐き気予防 アレルギー予防	点滴静注	15 分	↓		↓		↓		
生理食塩液 100mL	ルートフラッシュ	点滴静注	30 分	↓		↓		↓		
生理食塩液 250mL サイラムザ 8mg/kg	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓				↓		
生理食塩液 50mL	インフュージョン リアクションの 観察期間	点滴静注	1 時間	↓				↓		
5%ブドウ糖液 250mL パクリタキセル 80mg/m2	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓		↓		↓		
生理食塩液 50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓		↓		↓		

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	...	d8	...	d15	...	d28
レスタミンコーワ錠 50mg/回 1 日 1 回	アレルギー予防	↓						

【副作用】

《主な副作用全 Grade(10.0%以上)》(第Ⅲ相無作為化比較試験(RAINBOW 試験))

好中球減少症(54.4%)、貧血(33.9%)、白血球減少症(33.9%)、血小板減少症(13.1%)、悪心(35.2%)、下痢(32.4%)、腹痛(30.9%)、嘔吐(26.9%)、便秘(21.4%)、口内炎(19.6%)、複水(10.1%)、疲労(39.8%)、末梢性浮腫(25.1%)、無力症(21.1%)、発熱(18.0%)、体重減少(13.8%)、食欲衰退(40.1%)、背部痛(11.9%)、筋肉痛(10.4%)、末梢性感覚ニューロパチー(17.4%)、末梢性ニューロパチー(14.4%)、蛋白尿(16.5%)、鼻出血(30.6%)、呼吸困難(12.8%)、咳嗽(12.2%)、脱毛症(32.7%)、発疹(10.7%)、高血圧(23.9%)