

【レジメン名】

CBDCA+nab-PAC 療法

【適応疾患】

非小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン/CBDCA AUC=6	点滴静注	1 時間	DAY1
nab-パクリタキセル/nab-PAC 100mg/m ²	点滴静注	30 分	DAY1,8,15

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	D1	...	D8	...	D15	...
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓					
プロイメンド	150mg									
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓					
デキサート	4.95mg									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓					
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓					
アブラキサン	100mg/m ²									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓					
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓					
カルボプラチン	AUC=6									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓					
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分			↓		↓	
デキサート	6.6mg									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分			↓		↓	
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分			↓		↓	
アブラキサン	100mg/m ²									
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	30 分			↓		↓	

【内服スケジュール】

薬品名	目的	D1	D2	D3	D4	...	D21	D1
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1 日 1 回	吐き気予防	↓						↓
デカドロン錠 4mg/回 1 日 1 回 朝食後	吐き気予防		↓	↓	↓			

【副作用】

《重大な副作用》進行・再発の場合

好中球減少、血小板減少、貧血、白血球減少、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、体重減少、ヘマトクリット減少、赤血球減少、血中アルカリホスファターゼ増加、血中アルブミン減少、C-反応性蛋白増加、脱毛症、発疹、末梢性感覚ニューロパチー、味覚異常、頭痛、疲労、発熱、悪心、便秘、嘔吐、下痢、口内炎、食欲減退、関節痛、筋肉痛、鼻出血、しゃっくり

《Grade3 以上の副作用(5%以上の頻度)》進行・再発の場合

好中球減少 69.4%、血小板減少 13.9%、貧血 31.9%、白血球減少 48.6%、リンパ球減少症 9.7%、ヘマトクリット減少 6.9%、赤血球減少 6.9%、食欲減退 11.1%