

**【レジメン名】**

DOC 単剤 3W 療法

**【適応疾患】**非小細胞肺癌  進行・再発  術前補助  術後補助**【インターバル日数】**

1 コース 21 日

**【使用抗癌剤】**

| 一般名/ 略号                           | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ドセタキセル/DOC<br>60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 1 時間 | DAY1 |

**【注射スケジュール】**

| 薬品名     | 投与量                 | 目的       | 手技   | 点滴時間 | D1 | D2 | ... | D21 | D1 |
|---------|---------------------|----------|------|------|----|----|-----|-----|----|
| 生理食塩液   | 100mL               | 吐き気予防    | 点滴静注 | 30 分 | ↓  |    |     |     | ↓  |
| デキサート   | 6.6mg               |          |      |      |    |    |     |     |    |
| 5%ブドウ糖液 | 250mL               | 抗癌剤      | 点滴静注 | 1 時間 | ↓  |    |     |     | ↓  |
| ドセタキセル  | 60mg.m <sup>2</sup> |          |      |      |    |    |     |     |    |
| 生理食塩液   | 50mL                | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 15 分 | ↓  |    |     |     | ↓  |

**副作用**《主な副作用 (Grade $\geq$ 3)》 J Clin Oncol.18(12):2354-62(2000).(p2359)

発熱性好中球減少症 8%

好中球減少(Grade4) 54%

血小板減少(Grade4) 2%

神経障害(Grade $\geq$ 3) 1%下痢(Grade $\geq$ 3) 2%無力症(Grade $\geq$ 3) 12%悪心(Grade $\geq$ 3) 3%嘔吐(Grade $\geq$ 3) 1%