

【レジメン名】

CDBCA+VP-16 療法

【適応疾患】

小細胞肺癌 進行・再発 術前補助 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン/CBDCA AUC=5	点滴静注	1 時間	day1
エトポシド/VP-16 100mg/m ²	点滴静注	1 時間	day1、2、3

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	d3	...	d21	d1
生理食塩液 プロイメンド	100mL 150mg	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓					↓
生理食塩液 デキサート	100mL 4.95mg	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓					↓
5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250mL AUC=5	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓					↓
生理食塩液 ペプシド	500mL 100mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	90 分	↓					↓
ソルデム 3A	200mL	ルートフラッシュ	点滴静注	1 時間	↓					↓
生理食塩液 デキサート	100mL 4.95mg	吐き気予防	点滴静注	30 分		↓	↓			
生理食塩液 ペプシド	500mL 100mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	90 分		↓	↓			
ソルデム 3A	200mL	ルートフラッシュ	点滴静注	1 時間		↓	↓			

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d21	d1
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1 日 1 回	吐き気予防	↓						↓
デカドロン錠 4mg/回 1 日 1 回 朝食後	吐き気予防				↓			

副作用

《主な副作用》(Br J Cancer.97(2):162-9(2007).(p165))

・Grade ≥ 3 の副作用

好中球減少(95.0%)、血小板減少(56.0%)、白血球減少(54%)、貧血(29%)

・All Grade の副作用

低ナトリウム血症(61%)、悪心・嘔吐(60%)、AST 上昇(54%)、ALT 上昇(46%)、ビリルビン上昇(28%)、下痢(16%)