

【レジメン名】

アテゾリズマブ+CDBCA+VP-16 療法

【適応疾患】

小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

| 商品名/ 略号                             | 投与法  | 投与時間                  | 投与日      |
|-------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| アテゾリズマブ/Atezolizumab<br>1200mg/body | 点滴静注 | 初回 60 分<br>(30 分に短縮可) | day1     |
| カルボプラチン/CBDCA<br>AUC=5              | 点滴静注 | 1 時間                  | day1     |
| エトポシド/VP-16<br>100mg/m2             | 点滴静注 | 1 時間                  | day1、2、3 |

【注射スケジュール】

| 一般名/ 投与量                          | 目的       | 手技   | 点滴時間               | d1 | d2 | d3 | ... | d21 | d1 |
|-----------------------------------|----------|------|--------------------|----|----|----|-----|-----|----|
| 生理食塩液 100mL<br>プロイメンド 150mg       | 吐き気予防    | 点滴静注 | 30 分               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 100mL<br>デキサート 4.95mg       | 吐き気予防    | 点滴静注 | 30 分               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 50mL                        | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 10 分               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 250mL<br>テセントリク 1200mg/body | 抗癌剤      | 点滴静注 | 初回 60 分<br>30 分短縮可 | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 50mL                        | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 10 分               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 5%ブドウ糖液 250mL<br>カルボプラチン AUC=5    | 抗癌剤      | 点滴静注 | 1 時間               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 500mL<br>ベブシド 100mg/m2      | 抗癌剤      | 点滴静注 | 1 時間               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 50mL                        | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 10 分               | ↓  |    |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液 100mL<br>デキサート 4.95mg       | 吐き気予防    | 点滴静注 | 30 分               |    | ↓  | ↓  |     |     |    |
| 生理食塩液 500mL<br>ベブシド 100mg/m2      | 抗癌剤      | 点滴静注 | 1 時間               |    | ↓  | ↓  |     |     |    |
| 生理食塩液 50mL                        | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 10 分               |    | ↓  | ↓  |     |     |    |

【内服スケジュール】

| 薬品名                         | 目的    | d1 | d2 | d3 | d4 | ... | d21 | d1 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| グラニセトロンゼリー 2mg/回<br>1 日 1 回 | 吐き気予防 | ↓  |    |    |    |     |     | ↓  |
| デカドロン錠 4mg/回<br>1 日 1 回 朝食後 | 吐き気予防 |    |    |    | ↓  |     |     |    |

【副作用】

主な副作用は、疲労 24 例(12.1%)、好中球減少 23 例(11.6%)、食欲減退 22 例(11.1%)、血小板減少 19 例(9.6%)、悪心 18 例(9.1%)、甲状腺機能低下症 18 例(9.1%)、貧血 17 例(8.6%)、下痢 12 例(6.1%)、便秘 12 例(6.1%)、発疹 12 例(6.1%)等で

