

【レジメン名】

Bmab+mFOLFOX6 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 14 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ベバズマブ/Bmab 5mg/kg	点滴静注	30 分～90 分	day1
オキサリプラチン/L-OHP 85mg/m2	点滴静注	2 時間	day1
レボホリナートカルシウム/l-LV 200mg/m2	点滴静注	2 時間	day1
フルオロウラシル/5-FU 2400mg/m2	持続静注	46 時間	day1～2
フルオロウラシル/5-FU 400mg/m2	急速静注	15 分以内	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d14	d1
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
プロイメンド	150mg	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
デキサート	4.95mg	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分～90 分	↓				↓
ベバシズマブ	5mg/kg	抗癌剤	点滴静注	30 分～90 分	↓				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	2 時間	↓				↓
オキサリプラチン	85mg/m2	抗癌剤	点滴静注	2 時間	↓				↓
5%ブドウ糖液	250mL	5-FU の 効果増強	点滴静注	2 時間	↓				↓
レボホリナート	200mg/m2	5-FU の 効果増強	点滴静注	2 時間	↓				↓
5%ブドウ糖液	50mL	抗癌剤	急速静注	15 分	↓				↓
フルオロウラシル	400mg/m2	抗癌剤	急速静注	15 分	↓				↓
5%ブドウ糖液	500mL	抗癌剤	持続静注	46 時間	→				↓
フルオロウラシル	2400mg/m2	抗癌剤	持続静注	46 時間	→				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	目的	D1	D2	D3	D4	...	D14	D1
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1 日 1 回	吐き気止め	↓						
デカドロン錠 4mg/日 1 日 1 回 朝食後	吐き気止め		↓	↓	↓			