

【レジメン名】

Pmab+mFOLFOX6 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌(RAS 遺伝子野生型) 進行・再発 術前補助 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 14 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与方法	投与時間	投与日
ベクティビックス/Pmab 6mg/kg	点滴静注	1 時間	day1
オキサリプラチン/L-OHP 85mg/m2	点滴静注	2 時間	day1
レボホリナートカルシウム/l-LV 200mg/m2	点滴静注	2 時間	day1
フルオロウラシル/5-FU 2400mg/m2	持続静注	46 時間	day1~2
フルオロウラシル/5-FU 400mg/m2	急速静注	15 分以内	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d14	d1
生理食塩液	100mL	吐き気止め アレルギー予防	点滴静注	30 分	↓				↓
アロキシ	0.75mg								
デキサート	9.9mg								
ポララミン	5mg								
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓				↓
ベクティビックス	6mg/kg								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	2 時間	↓				↓
オキサリプラチン	85mg/m2								
5%ブドウ糖液	250mL	5-FU の 効果増強	点滴静注	2 時間	↓				↓
レボホリナート	200mg/m2								
5%ブドウ糖液	50mL	抗癌剤	急速静注	15 分	↓				↓
フルオロウラシル	400mg/m2								
5%ブドウ糖液	500mL	抗癌剤	持続静注	46 時間	→				↓
フルオロウラシル	2400mg/m2								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	…	d14	d1
デカドロン錠 8mg/日 1日2回 朝昼食後	吐き気止め		↓	↓				
塩酸ミノサイクリン 200mg/日 1日2回 朝夕食後	皮膚障害の予防	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ビーソフテンクリーム(ヘパリン類似物質) 1日5回塗布 全身	皮膚障害の予防	連日使用						
アンテベート軟膏(ベリーストロング) 1日2回塗布 体・爪周囲の症状発現部位	皮膚障害の治療	症状発現時使用						
ロコイドクリーム(マイルド) 1日2回塗布 顔の症状発現部位	皮膚障害の治療	症状発現時使用						