

【レジメン名】

RAM+FOLFIRI 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 14 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ラムシルマブ/RAM 8mg/kg	点滴静注	1 時間	day1
イリノテカン/CPT-11 150mg/m ²	点滴静注	1 時間 30 分	day1
レボホリナートカルシウム/I-LV 200mg/m ²	点滴静注	1 時間 30 分	day1
フルオロウラシル/5-FU 2400mg/m ²	持続静注	46 時間	day1～2
フルオロウラシル/5-FU 400mg/m ²	急速静注	15 分以内	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d14	d1
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
プロイメンド	150mg								
生理食塩液	100mL	吐き気止め	点滴静注	30 分	↓				↓
デキサート	4.95mg								
生理食塩液	250mL	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓				↓
サイラムザ	8mg/kg								
生理食塩液	50mL		点滴静注	1 時間	↓				↓
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	1 時間 30 分	↓				↓
イリノテカン	150mg/m ²								
5%ブドウ糖液	250mL	5-FU の	点滴静注	1 時間 30 分	↓				↓
レボホリナート	200mg/m ²	効果増強							
5%ブドウ糖液	50mL	抗癌剤	急速静注	15 分	↓				↓
フルオロウラシル	400mg/m ²								
5%ブドウ糖液	500mL	抗癌剤	持続静注	46 時間	→				↓
フルオロウラシル	2400mg/m ²								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	…	d14	d1
レスタミンコーワ錠 50mg/日 1日1回	アレルギー予防	↓						↓
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1日1回	吐き気止め	↓						↓
デカドロン錠 4mg/日 1日1回 朝食後	吐き気止め		↓	↓	↓			
ウルソデオキシコール酸錠 300mg/日 1日3回 毎食後 * 必要に応じて	胆汁分泌を促して 副作用を予防	↓	↓	↓				↓
炭酸水素ナトリウム 1.8g/日 1日3回 毎食後2時間 * 必要に応じて	腸内をアルカリにし て副作用を予防	↓	↓	↓				↓
酸化マグネシウム 2g/日 1日3回 毎食後 * 必要に応じて	便秘による副作用 の悪化を予防	↓	↓	↓				↓
半夏瀉心湯 7.5g/日 1日3回 毎食前 * 必要に応じて	下痢を軽減する薬	↓	↓	↓				↓