

【レジメン名】

CBDCA+ALIMTA+Bmab 療法

【適応疾患】

非小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ/Bmab 15mg/kg	点滴静注	90 分 2 回目以降 60 分に短縮可	day1
ペメトレキセド/ALIMTA 500mg/m ²	点滴静注	10 分	day1
カルボプラチン/CBDCA AUC=5~6	点滴静注	1 時間	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓				↓
プロイメンド	150mg								
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓				↓
デキサート	4.95mg								
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	10 分	↓				↓
アリムタ	500mg.m ²								
5%ブドウ糖液	250mL	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓				↓
カルボプラチン	AUC=5~6								
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	90 分~60 分	↓				↓
アバスタチン	15mg/kg								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	30 分	↓				↓
メチコパール	1mg	アリムタの 副作用予防	筋注	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで					

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d21	d1
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1 日 1 回	吐き気予防	↓						↓
デカドロン錠 4mg/回 1 日 1 回 朝食後	吐き気予防		↓	↓	↓			
パンプタン末 1g/日 1 日 1 回	アリムタの 副作用予防	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで						

【副作用】

《主な副作用（Grade $\geq$ 3）》 J Clin Oncol.31(34):4349–57(2013).(p4356)

発熱性好中球減少症 1.4%

好中球減少(Grade $\geq$ 3) 25.8%

貧血(Grade $\geq$ 3) 14.5%

血小板減少(Grade $\geq$ 3) 23.3%

疲労(Grade $\geq$ 3) 10.9%

血栓塞栓症(Grade $\geq$ 3) 3.2%

消化管出血または肺出血(Grade $\geq$ 3) 1.8%

高血圧(Grade $\geq$ 3) 3.4%