

【レジメン名】

ペムブロリズマブ+ALIMTA 療法(維持療法)

【適応疾患】

非小細胞肺癌 進行・再発 術前補助 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ/Pembrolizumab 200mg/body	点滴静注	30 分	day1
ペメトレキセド/ALIMTA 500mg/m2	点滴静注	10 分	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓				↓
デキサート	6.6mg								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓				↓
キイトルーダ	200mg/body								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	10 分	↓				↓
アリムタ	500mg.m2								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓				↓
メチコパール	1mg	アリムタの 副作用予防	筋注	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで					

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d21	d1
パンピタン末 1g/日 1 日 1 回	アリムタの 副作用予防	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで						