

【レジメン名】  
アバスチン療法

【適応疾患】  
脳放射線壊死     進行・再発     術前補助     術後補助

【インターバル日数】  
1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

| 一般名/ 略号                | 投与方法 | 投与時間                   | 投与日  |
|------------------------|------|------------------------|------|
| ベバシズマブ/Bmab<br>15mg/kg | 点滴静注 | 初回 90 分<br>(30 分まで短縮可) | day1 |

【注射スケジュール】

| 薬品名            | 投与量              | 目的       | 手技   | 点滴時間      | d1 | d2 | ... | D21 | d1 |
|----------------|------------------|----------|------|-----------|----|----|-----|-----|----|
| 生理食塩液          | 50mL             | ルート確保    | 点滴静注 | 15 分      | ↓  |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液<br>アバスチン | 100mL<br>15mg/kg | 抗癌剤      | 点滴静注 | 30 分～90 分 | ↓  |    |     |     | ↓  |
| 生理食塩液          | 50mL             | ルートフラッシュ | 点滴静注 | 15 分      | ↓  |    |     |     | ↓  |

【副作用】

● 重大な副作用

脳出血（腫瘍関連出血を含む）、脳出血以外の出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、骨髄抑制、感染症、高血圧性脳症・高血圧性クレーゼ（高血圧）、ネフローゼ症候群（蛋白尿）、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔・瘻孔、ショック、アナフィラキシー、間質性肺炎、うっ血性心不全、血栓性微小血管症