

【レジメン名】

Bmab+Capecitabine 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
カペシタビン/Cape 2000mg/m ²	経口	2 回/日	day1～day14
ベバシズマブ/Bmab 7.5mg/kg	点滴静注	90 分	day1

【腎障害の目安と対処】

【重篤な腎障害のある患者】

投与開始前のクレアチニン・クリアランスが30 mL/min未満の患者→**投与禁忌**

【腎障害のある患者】

中等度：投与開始前のクレアチニン・クリアランスが30～50 mL/minの患者→75%用量(減量段階1)で開始

軽 度：投与開始前のクレアチニン・クリアランスが51～80 mL/minの患者→初回減量は不要

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液	100mL	ルート確保	点滴静注	30 分	↓				↓
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	90 分	↓				↓
アバスタチン	7.5mg/kg								
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d14	...	d21	d1
カペシタビン錠 2000mg/m ² 1 日 2 回 朝夕食後	抗癌剤	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓
ピドキサル錠 30mg/日 1 日 3 回 毎食後	手足症候群 の予防	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ベギンクリーム(尿素クリーム) 1 日 5 回塗布 手足全体	手足症候群 の予防	連日使用								
アンテベート軟膏(ペリーストロング) 1 日 2 回塗布 体・爪周囲の症状発現部位	手足症候群 の治療	症状発現時使用								